



ТЕРМІНОЛОГІЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ»

Лектор: д. с.-г. н., проф. Забалуєв В.О.



ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Суть і зміст рекультивації земель.
Загальні поняття і терміни.
2. Землі які підлягають рекультивації.
3. Основні завдання рекультивації.
4. Коротко етапи рекультивації.

Рекультивация земель

- Комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности та господарської цінності порушених земель.
- Мета — поліпшення умов довкілля та повернення земель до раціонального використання.
- Рекультивация є складовою охорони земель відновлення ґрунтового покриву.

Схематично: від порушеної до рекультивованої землі



Які землі підлягають рекультивації?

Порушений рельєф

Землі, де змінено форму поверхні внаслідок гірничих, будівельних та інших робіт.



Порушений ґрунтовий покрив

Зміни ґрунту, материнських і підстиляючих порід.



Еродовані та низькопродуктивні землі

За відповідних умов також можуть бути об'єктами рекультивації.

Основне завдання рекультивації

Сільське господарство

Повернення земель до ріллі, багаторічних насаджень, кормових угідь.

Лісове господарство

Створення умов для лісорозведення та стабілізації поверхні.

Інші напрями

Рибне господарство, промислове й комунальне будівництво, тепличні господарства, зони відпочинку.

**ПОРУШЕНА
ЗЕМЛЯ**



**придатний стан
для подальшого використання**

Технічна рекультивація

Знімання та збереження родючого шару

Основні інженерні роботи

1

Знімання і складування

родючого та потенційно родючого матеріалу

2

Формування рельєфу

відвали, укоси, тераси, засипання провалів

3

Меліорація

хімічна меліорація токсичних ґрунтів

4

Нанесення ґрунту

покриття вирівняної поверхні родючим матеріалом

5

Інфраструктура

дренаж, дороги, виїзди, гідротехнічні споруди

родючий шар

потенційно родюча порода

малородюча / токсична порода



Знімання та збереження родючого шару ґрунту

- Родючий шар знімають під час видобування корисних копалин, промислового та житлового будівництва, прокладання доріг і гідротехнічних споруд.
- Знятий матеріал складують або переміщують на малопродуктивні землі для подальшого відновлення родючості.
- Важливо забезпечити селективне знімання, окреме складування та подальше раціональне використання.



Потужність шару, що залишається на торфовищах

Напрямок використання	Мінімальна потужність шару торфу
Вирощування сільськогосподарських культур	не менше 0,5 м
Лісорозведення	не менше 0,3 м
Водойми, ставково-рибні господарства та інші цілі	0,15 м

Ключова вимога


Залишкова товщина шару має забезпечувати необхідний водно-повітряний і поживний режими для майбутнього використання.

Біологічна рекультивація

- Створення сприятливого водно-повітряного та поживного режимів ґрунту.
- Запровадження сівозмін із культурами на сидеральне добриво.
- Внесення органічних і мінеральних добрив.
- Мульчування та інші агротехнічні й фітомеліоративні заходи.

Біологічна рекультивація

рослинність → органічна речовина → стабілізація ґрунту



Технічний етап рекультивації.

До комплексу робіт технічного етапу належать: вирівнювання, формування укосів,

- знімання, транспортування та нанесення на рекультивовані землі ґрунту
- докорінна меліорація
- будівництво доріг,
- спеціальних гідротехнічних споруд (ГОСТ-83).

Найпоширенішими вимогами до технічного етапу рекультивації є такі:

- селективне знімання родючих гумусованих горизонтів ґрунту;
- селективне знімання потенційно родючої породи (переважно леси та лесовидні суглинки);
- переміщення до відвалів суміші безплідних і токсичних порід;
- своєчасне огрублене планування (вирівнювання) відвалів з токсичними та індиферентними породами для забезпечення рівномірного їх осідання;
- покриття токсичних порід після їх ретельного планування шаром глинистих порід;
- нанесення шару потенційно родючої породи завтовшки 1,5-2 м;
- покриття відвалів шаром родючого ґрунту завтовшки 30-50 см.

Орієнтована потужність шару ґрунту, що знімається

Тип ґрунту	Орієнтована потужність, см
Дерново-підзолисті окультурені	15–20
Ясно-сірі та сірі опідзолені	15–30
Темно-сірі опідзолені	40–50
Чорноземи типові, вилугувані, опідзолені та реградовані	100–120
Чорноземи звичайні	40–70
Чорноземи південні та темно-каштанові	35–50
Каштанові	20–30

Технічний етап рекультивації при будівництві шляхів та інших лінійних об'єктів полягає у зніманні у порушеній смугі шару ґрунту, створенні насипів з підґрунтя і покритті резервних ділянок гумусовим шаром.

- При шахтному способі видобування корисних копалин пуста порода знову повертається у вироблені штреки.
- При неможливості повернення її у штреки створюються зовнішні відвали (терикони, териконники), під які відводяться малопродуктивні землі чи яри.
- Після 2-3 річного осідання відвали вирівнюють, покривають потенційно родючою породою, шаром ґрунту та передають для біологічної рекультивації.



При підземному добуванні корисних копалин може відбуватися **деформація поверхні ґрунту внаслідок осідання**. Залежно від характеру деформацій у межах шахтного поля на поверхні знімається шар ґрунту, провали засипаються, розрівнюються і після остаточного осідання вирівнюються і покриваються шаром ґрунту.

Вплив видобутку корисних копалин на довкілля



Вироблені торфовища при фрезерному і машино-формувавальному способах видобування торфу потрібно повернути землекористувачам для використання їх під сіножаті, пасовища, обліснення та обводнення.

З цією метою влаштовують осушувальну мережу, *проводять планування поверхні, споруджують дороги.*

Торфовища, вироблені гідроспособом, звичайно рекультивують для рибно-господарського використання. На них здійснюють *корчування та вивезення пнів, планування та закладення осушувальної мережі.*



Біологічний етап рекультивації

Сільськогосподарська рекультивація

Підготовка землі під рілля, багаторічні насадження або природні кормові угіддя.

Лісова рекультивація


Створення умов для лісорозведення та закріплення відвалів.

Обмеження

У зоні родючих чорноземів під рілля рекомендується рекультивувати не більше 70% порушених земель; решта може використовуватись для укосів, шляхів і протиерозійних споруд.

Біологічна рекультивація

рослинність → органічна речовина → стабілізація ґрунту



Порушені землі мають несприятливі режими, на них навіть багаторічні трави потребують удобрення. Найбільші прирости врожаю були отримані у варіанті з повним мінеральним добривом. Велике значення має глибина насипного гумусованого шару. . У загальному випадку економічно доцільним є насипання гумусового шару ґрунту до глибини 50 см. Для відновлення родючості і підвищення врожайності сільськогосподарських культур велике значення мають *норми внесення добрив*.



У меліоративний період рекультивації найдоцільніше вирощувати багаторічні трави, особливо бобові - люцерну, еспарцет, буркун - з використанням їх як сидератів.

Після проходження меліоративного періоду рекультивовані землі **включають до складу ріллі** під польові, кормові і ґрунтозахисні сівоzmіни.

Створення кормових угідь на рекультивованих землях є найдоцільнішим тоді, коли не вистачає гумусованого шару для їх покриття.



- На рекультивованих землях **без покриття** гумусованим шаром створюють сіяні сіножаті, які підвищуватимуть їх потенціальну родючість.
- При протиерозійній організації території рекультивованих земель **під залуження** відводять укоси відвалів, щоб травостій попереджав розвиток водної ерозії



- **Під лісову рекультивацію** можна відводити відвали з різними ґрунтосумішами без селективного відсипання. Якщо ґрунтосуміші токсичні, проводять їх хімічну меліорацію або перекривають потенційно родючими породами. Менш строгими у даному випадку є і вимоги до загального планування (вирівнювання) відвалів.



Тут був кар'єр. Фото рекультивованої ділянки

Протиерозійні заходи в проекті рекультивації

Водорегулювання

водозатримні та водовідвідні вали; водоскидні споруди

Рельєф

терасування та формування стійких укосів

ЗАПОБІГАННЯ ЕРОЗІЇ

Рослинний покрив

залуження та залісення

Агротехнології

грунтозахисні технології вирощування культур

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

