

## ЛЕКЦІЯ №1

### Поняття похідної функції, її геометричний та механічний зміст. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних.

1. Означення похідної.....	1
2. Геометричний зміст похідної.....	2
3. Механічний зміст похідної.....	3
4. Залежність між неперервністю і диференційовністю функції.....	3
5. Основні правила диференціювання.....	4
6. Похідні від основних елементарних функцій.....	5

#### 1. Означення похідної

Нехай функція  $y = f(x)$  визначена на деякому проміжку  $(a; b)$ . Візьмемо значення  $x \in (a; b)$  і надамо аргументу приросту  $\Delta x$ . Тоді функція набуде приросту  $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ . Розглянемо відношення приросту функції  $\Delta y$  до приросту аргументу  $\Delta x$  і перейдемо до границі при  $\Delta x \rightarrow 0$ :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \quad (1)$$

Якщо границя (1) існує і скінченна, вона називається *похідною функції*  $y = f(x)$  за змінною  $x$  і позначається

$$y', \quad y'_x, \quad \frac{dy}{dx}, \quad f'(x), \quad \frac{df(x)}{dx}.$$

**Означення.** *Похідною функції*  $y = f(x)$  за аргументом  $x$  називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля.

Операція знаходження похідної називається *диференціюванням* цієї функції.

Користуючись означенням похідної, знайти похідні функцій.

**Приклад.** Функція  $y = x^2$ . Знайти похідну в точках  $x = 3$  і  $x = -4$ .

● Надамо аргументу  $x$  приросту  $\Delta x$ , тоді функція набуде приросту  $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + \Delta x^2 + x^2 - x^2 = 2x\Delta x + \Delta x^2$ .

Складемо відношення приросту функції до приросту аргументу  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x + \Delta x$ , відшукаємо границю  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x$ . Таким чином,  $f'(x) = 2x$ .

Похідна в точці  $x = 3$   $f'(3) = 2 \cdot 3 = 6$ , а похідна при  $x = -4$  буде  $f'(-4) = 2 \cdot (-4) = -8$ .

**Приклад.**  $y = C$ , де  $c = \text{const}$ .

● Надавши аргументу  $x$  приросту  $\Delta x$ , дістанемо приріст функції  $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = C - C = 0$ . Тепер знайдемо границю відношення  $\Delta y / \Delta x$  при  $\Delta x \rightarrow 0$ :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0, \text{ тобто } C' = 0$$

**Приклад.**  $y = \sin x$ .

- Користуючись відомою з тригонометрії формулою

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2},$$

знайдемо приріст функції у точці  $x$  і обчислимо границю:

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos \left( x + \frac{\Delta x}{2} \right),$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos \left( x + \frac{\Delta x}{2} \right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cos \left( x + \frac{\Delta x}{2} \right) = \cos x;$$

$$(\sin x)' = \cos x.$$

Аналогічно можна дістати:  $(\cos x)' = -\sin x$ .

**Приклад.**  $y = e^x$ .

- Для цієї функції маємо

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = e^x \cdot 1 = e^x,$$

тобто  $(e^x)' = e^x$ .

## 2. Геометричний зміст похідної

**Означення.** Дотичною до кривої  $L$  у точці  $M$  називається граничне положення  $MN$  січної  $MM_1$  при прямуванні точки  $M_1$  по кривій  $L$  до точки  $M$  (рис. 1).

Нехай крива, задана рівнянням  $y = f(x)$ , має дотичну в точці  $M(x, y)$ . Позначимо (рис. 2) кутовий коефіцієнт дотичної  $MN$ :  $k = \operatorname{tg} \varphi$ . Надамо в точці  $x$  приросту  $\Delta x$ , тоді ордината  $y$  набуде приросту  $\Delta y$ .

З  $\Delta MAM_1$  випливає, що  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \operatorname{tg} \alpha$ . Коли  $\Delta x \rightarrow 0$ , то  $M_1 \rightarrow M$ ,  $\alpha \rightarrow \varphi$  і січна прямує до положення дотичної  $MN$ .

Таким чином,  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \varphi = k$ .




Рис. 1




Рис. 2

Оскільки  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$ , то  $f'(x) = k$ , тобто похідна  $f'(x)$  чисельно дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної, проведеної до графіка функції у точці з абсцисою  $x$ . У цьому полягає геометричний зміст похідної.

### 3. Механічний зміст похідної

Припустимо, що точка  $M$  рухається прямолінійно нерівномірно по деякій прямій лінії, яку візьмемо за вісь  $Ox$  (рис. 3).




Рис. 3

Рух точки відбувається за законом  $x = f(t)$ , де  $x$  — шлях;  $t$  — час. Знайдемо швидкість точки  $M$  у даний момент часу  $t$  (миттєва швидкість).

Нехай точка  $M$  у момент  $t$  перебувала на відстані  $x$  від початкової точки  $M_0$ , а в момент часу  $t + \Delta t$  точка опинилася на відстані  $x + \Delta x$  від початкової точки й зайняла положення  $M_1$ . Отже, час  $t$  набув приросту  $\Delta t$ , а шлях  $x$  — приросту  $\Delta x = f(t + \Delta t) - f(t)$ . Середня швидкість руху точки  $M$  за час  $\Delta t$  описується формулою  $v_{\text{cp}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ .

Якщо точка  $M$  рухається рівномірно, то  $v_{\text{cp}}$  є величина стала, і її беруть за швидкість точки. Для нерівномірного руху точки очевидно, що для достатньо близьких значень  $\Delta t$  до нуля середня швидкість точки  $M$  буде близька до її швидкості у момент часу  $t$ . Тому за точне значення швидкості точки  $M$  у момент часу  $t$  беруть величину

$$V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t},$$

яка є швидкістю зміни функції  $x = f(t)$  у точці. У цьому полягає механічний зміст похідної.

### 4. Залежність між неперервністю і диференційовністю функції

Функція  $y = f(x)$  є неперервною в точці  $x$ , якщо у цій точці  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ .

**Означення.** Функція  $y = f(x)$  називається диференційовною в точці, якщо у цій точці вона має похідну, тобто якщо існує кінцева границя:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x).$$

**Означення.** Функція  $y = f(x)$  називається диференційовною на інтервалі  $(a; b)$ , якщо вона диференційовна в кожній точці даного інтервалу.

Зв'язок між неперервністю і диференційовністю функції встановлює теорема.

**Теорема.** Якщо функція диференційовна в деякій точці, то у цій точці функція неперервна.

Обернене твердження неправильне: для неперервної функції може не існувати похідної.

Справді, нехай функція  $y = f(x)$  диференційовна в точці  $x$ . Запишемо тотожність  $\Delta y = \frac{\Delta y \cdot \Delta x}{\Delta x}$  ( $\Delta x \neq 0$ ), звідси  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y \cdot \Delta x}{\Delta x} = f'(x) \cdot 0 = 0$ .

Таким чином, функція  $y = f(x)$  неперервна в точці  $x$ .

**Наслідок.** Якщо функція розривна в деякій точці, то вона не має похідної в цій точці.

Прикладом має похідної в одній (рис. 5). Ця функція ди- значення, оскільки в існує дотичної до Таким чином, диференційовності неперервність у цій




Рис. 5

неперервної функції, що не точці, є функція  $y = |x|$  неперервна при  $x = 0$ , але не ференційовна для цього точці з абсцисою  $x = 0$  не графіка функції. необхідно умовою функції  $y = f(x)$  у точці  $x \in \mathbb{R}$  точці.

## 5. Основні правила диференціювання

**Теорема 1.** Похідна сталої дорівнює нулю, тобто якщо  $y = c$ , де  $c = \text{const}$ , то  $y' = 0$ .

**Теорема 2.** Похідна алгебраїчної суми скінченної кількості диференційовних функцій дорівнює алгебраїчній сумі похідних цих функцій:  $(u(x) \pm v(x))' = u'(x) \pm v'(x)$ .

**Теорема 3.** Похідна добутку двох диференційовних функцій дорівнює добутку першого множника на похідну другого плюс добуток другого множника на похідну першого:

$$(uv)' = u'v + uv'$$

**Теорема 4.** Сталій множник можна виносити за знак похідної:

$$(cu)' = cu', \text{ де } c = \text{const}.$$

**Теорема 5.** Якщо чисельник і знаменник дробу диференційовні функції (знаменник не перетворюється в нуль), то похідна дробу також дорівнює дробу, чисельник якого є різницею добутків знаменника на похідну чисельника і чисельника на похідну знаменника, а знаменник є квадратом знаменника початкового дробу

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

**Зауваження.** Похідну від функції  $y = \frac{u(x)}{c}$ , де  $c = \text{const}$ , зручно обчислювати як похідну від добутку сталої величини  $\frac{1}{c}$  на функцію  $u(x)$ :

$$\left(\frac{u(x)}{c}\right)' = \left(\frac{1}{c}u(x)\right)' = \frac{1}{c}u'(x).$$

**Приклад.** Обчислити похідну для функції  $y = \text{tg } x$ .

$$\begin{aligned} y' = (\text{tg } x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - (\cos x)' \sin x}{\cos^2 x} = \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

Таким чином,  $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ .

**Похідна складної функції.** Нехай  $y = f(u)$ , де  $u = \varphi(x)$ , тобто  $y = f(\varphi(x))$ . Функція  $f(u)$  називається *зовнішньою*, а функція  $\varphi(x)$  — *внутрішньою*, або *проміжним аргументом*.

**Теорема 6.** Якщо  $y = f(u)$  та  $u = \varphi(x)$  — диференційовні функції від своїх аргументів, то похідна складної функції існує і дорівнює  $y'_x = f'_u \cdot u'_x$ .

Таким чином, похідна складної функції дорівнює добутку похідної зовнішньої функції за проміжним аргументом на похідну проміжного аргументу за незалежною змінною.

## 6. Похідні від основних елементарних функцій

За аналогією з попередніми прикладами можна дістати похідні від основних елементарних функцій:

- |                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. $(x)' = 1$ ;                                     | 2. $(x^m)' = mx^{m-1}$ ;                               |
| 3. $(e^x)' = e^x$ ;                                 | 4. $(a^x)' = a^x \ln a$ ;                              |
| 5. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ;                       | 6. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ ;                 |
| 7. $(\sin x)' = \cos x$ ;                           | 8. $(\cos x)' = -\sin x$ ;                             |
| 9. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ ;  | 10. $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$ ;  |
| 11. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ;       | 12. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ;         |
| 13. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$ ; | 14. $(\operatorname{arccctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$ . |

Продиференціювати подані далі функції.

**Приклад.**  $y = 3x^2 - \sqrt[3]{x} + \ln x$ .

● Дана функція є алгебраїчною сумою функцій, тому використовуємо теорему 2:

$$y' = (3x^2)' - \left(x^{\frac{1}{3}}\right)' + (\ln x)'$$

У здобутому виразі перший доданок алгебраїчної суми є добуток сталої величини на степеневу функцію  $\Rightarrow$  — застосуємо до нього теорему 4 і формулу (2) таблиці похідних; другий — ірраціональна функція з показником  $m = \frac{1}{3}$  — застосуємо формулу (2) таблиці похідних; третій — логарифмічна функція з основою  $e \Rightarrow$  — використаємо формулу (5):

$$y' = 3 \cdot 2x - \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} + \frac{1}{x} = 6x - \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{1}{x}$$

**Приклад.**  $y = 6^{\arcsin(x^5-4)}$ .

● Задана функція складна: зовнішня — показникова функція з основою 6, внутрішня для неї — обернена тригонометрична. Обернена тригонометрична,

у свою чергу, є складною, для якої внутрішня функція — алгебраїчна сума  $x^5 - 4$ . Для суми аргументом (скінченим) є  $x$ .

Таким чином, задана функція є суперпозицією трьох функцій.

При диференціюванні послідовно застосовуємо два рази теорему 6:

$$\begin{aligned} y &= \left[ 6^{\arcsin(x^5-4)} \right]_{\arcsin(x^5-4)}' \left[ \arcsin(x^5-4) \right]_x = \\ &= \left[ 6^{\arcsin(x^5-4)} \right]_{\arcsin(x^5-4)}' \left[ \arcsin(x^5-4) \right]_{x^5-4} \left[ x^5-4 \right]_x. \end{aligned}$$

У цьому виразі знизу біля кожної квадратної дужки вказано аргумент, за яким слід диференціювати функцію, взяту в дужки.

Тепер послідовно скористаємося формулами (4), (11), (2) таблиці похідних та теоремами 1, 2. Дістанемо:

$$y' = 6^{\arcsin(x^5-4)} \ln 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(x^5-4)^2}} \cdot 5x^4.$$

Взагалі використані правила та формули не фіксують, а записують кінцевий результат їх застосування.