

**Таблиця Оптимальна реакція ґрунтового середовища для
сільськогосподарських культур, плодових насаджень і мікроорганізмів**

Культура	pH	Культура	pH
Пшениця озима	6,3–7,7	М'ятлик	5,3–6,0
Пшениця яра	6,0–7,5	Вівсяниця лугова	5,3–6,0
Ячмінь	6,8–7,5	Грястиця збірна	6,0–8,0
Жито озиме	5,5–7,5	Льон	5,5–6,5
Овес	5,0–7,5	Коноплі	7,1–7,4
Кукурудза	6,0–7,0	Тютюн	6,5–8,0
Рис	4,0–6,0	Морква	5,5–7,0
Просо	5,5–7,5	Капуста	6,5–7,4
Гречка	4,7–7,5	Огірки	6,4–7,0
Горох	6,0–7,0	Цибуля	6,4–7,9
Соя	6,5–7,1	Томати	6,3–6,7
Квасоля	7,0–8,0	Салат	6,0–6,5
Вика	5,7–6,5	Щавель	4,5–5,0
Люпин	4,5–6,0	Селера	5,8–7,5
Боби кормові	6,0–7,0	Цикорій	6,0–6,5
Соняшник	6,0–6,8	Гарбузи	5,3–6,0
Буряки цукрові	7,0–7,5	Яблуна	6,5–7,5
Картопля	5,0–5,5	Груша	4,5–6,0
Буряки кормові	6,2–7,5	Абрикос	7,0–8,5
Бруква	4,8–5,5	Слива	6,5–8,0
Турнепс	6,0–6,5	Вишня	6,5–8,5
Люцерна	7,0–8,0	Виноград	7,0–8,7
Конюшина	6,0–7,0	Гриби ґрунту	3,5–6,0
Буркун	7,0–8,7	Азотобактер	6,7–6,8
Житняк	7,0–8,5	Нітрифікатори	6,0–8,0
Райграс	6,8–7,5	Денітрофікатори	7,0–8,0
Тимофіївка	5,0–7,5	Бульбочкові бактерії конюшини	6,0–7,0

